

患者
番号
氏名
生年
月日
所属

性別

発行
年月日

化学療法注射箋

身長	体重	投与可能 中止	最終決定 医師署名
BSA=0.00 m2			

レジメン名		疾患名			医師					
R-CHOP					薬剤師					
1コース：3週		6～8コース			看護師					
Rp	薬品名・規格	投与量	手技	投与 ルート	点滴時間 速度	day1	Day3	Day22	Day24	
						/	/	/	/	/
						曜日	曜日	曜日	曜日	曜日
1	生食 リツキサン (375mg/m2)	500mL	DIV	メイン	*1	○		○		
2	グラニセトロン3mg/バッグ	3mg/100mL	DIV	メイン	30min		○		○	
3	生食 エンドキサン (750mg/m2)	500mL	DIV	メイン	2hr		○		○	
	閉鎖式混合容器使用									
4	生食 ドキシソルピシン (50mg/m2)	100mL	DIV	メイン	1hr		○		○	
5	生食 オンコビン (1.4mg/m2)	50mL	DIV	メイン	15min		○		○	

*1初回 最初の30分50mg/h その後30分毎に50mg/hずつあげて最大400mg/hまで可能
2回目以降は副作用が軽微であった場合、100mg/hから開始、その後30分毎に50mg/hずつあげて最大400mg/hまで可能
前投薬：リツキサン投与30前に抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤を投与する。副腎皮質ホルモン剤の前投薬は必要時。